

Les tiques sont des parasites appartenant à la classe des arachnides (comme les araignées et les acariens).

Lés deux principales espèces de tique en France sont Dermacentor reticulatus et Ixodes ricinus.

a « saison » des tiques s'étend de mars à octobre, avec 2 pics en avril/mai et en septembre/ octobre. La morsure de tique en ellemême est sans danger, mais elle est le vecteur d'un certain nombre de maladies infectieuses, dont certaines, comme la maladie de Lyme, sont transmissibles à l'homme.

POUR LES PRÉVENIR VOILÀ QUELQUES PETITES ASTUCES

- Limiter l'accès des chiens aux zones naturelles pouvant être gorgées de tiques. Attention aux promenades à la campagne ou en forêt en été et en automne! Il est conseillé d'examiner l'animal au retour de promenade : si des tiques sont trouvées, il faut les retirer manuellement. La meilleure méthode pour décrocher une tique est d'utiliser un crochet anti-tique, conçu spécialement à cet usage.
- La méthode la plus pratique est de traiter son animal préventivement avec un produit (collier, spot-on...) contre les tiques prescrit par le vétérinaire. Il en existe diverses présentations avec des modes et des rythmes d'administration va-



riés. N'oubliez pas qu'un traitement contre les tiques doit être régulièrement renouvelé et que la protection atteint rarement les 100%.

MAIS QUE FAIRE EN CAS DE PIQÛRE DE TIQUES

- Retirer la tique au plus vite, en se servant d'un tire-tique (vendu en pharmacie), qui permet d'extraire la tique sans arracher le rostre qui, sinon, resterait enfoncé dans la peau, grâce à un mouvement rotatif lors de l'extraction.
- Désinfecter l'épiderme.
- Il est parfois conseillé de consulter, avant toute apparition de symptôme, dans les 2 cas suivants : si la tique est restée en place plus de 36 h, ou si elle est déjà gorgée de sang (abdomen distendu) lorsqu'on la découvre.

A ÉVITER

- Ne pas tirer sur la tique : on a toutes les chances de laisser un morceau du parasite en place.
- Ne pas presser sur l'abdomen du parasite car elle est à l'origine d'une régurgitation, or c'est au cours de la régurgitation que se produit la transmission des maladies!
- Ne pas utiliser de produit sur la tique (éther, alcool, désinfectant...) ou la brûler avec une cigarette : cela produit également une régurgitation réflexe, et donc augmente le risque de transmission de maladie.

